



© Bobo / Fotolia

داء الشريان التاجي – ما يمكنك أن تفعل أو أقاربك القيام به في حالات الطوارئ

◀ أعراض الحالة الاعسافية

- الأعراض التي تشير إلى وجود حالة اسعافية هي:
- آلام قوية خلف عظم القص والتي قد تنتقل إلى القفا أو العنق أو الفك أو لوحى الكتف أو الذراعين أو إلى رأس المعدة.
- إحساس قوي بالضيق، ضغط شديد في القفص الصدري
- تزايد حدة ضيق التنفس، صعوبة في التنفس
- نوبات تعرق مصحوبة بعرق بارد
- غثيان،قيء
- الخوف من الموت
- شحوب لون الوجه
- الأعراض التي تدوم أكثر من بضع دقائق
- الأعراض التي تظهر في حالة راحة
- الأعراض التي تظل قائمة بالرغم من أنك انتهيت من مجھود بدني، مثل صعود الدرج
- الأعراض التي تظل قائمة بالرغم من تناولك الدواء الخاص بالطوارئ – مثل الرذاذ نيترو –

قد يكون لحالة اسعافية تصيب القلب علامات أخرى ليست بالضرورة نموذجية لذلك، حيث يشعر بالأحرى بعض الناس بآلام على مستوى البطن، والتي تكون مصحوبة بالغثيان أو القيء، وخاصة لدى النساء. يشير جميع المصابين تقريبًا إلى كون حالتهم تدهورت "بشكل جد مفاجئ". ليس من السهل دائمًا التمييز بين حالة التدهور المؤقت القصيري المدى والحالة الاعسافية الخطيرة. إذ غالباً ما تكون الانقلالات من حالة إلى أخرى غير واضحة.

اعمل، في حالة إذا كنت غير متأكد مما إذا كان الأمر يتعلق حقاً بحالة اسعافية، بطلب المشورة من خبراء في أقرب وقت ممكن، مثلًا من طبيب أو طبيب الأسرة الخاصين بك أو من خدمات الطوارئ الطبية: الرقم المخصص لذلك على الصعيد الوطني هو 117 116.

ينبغي لك في حالة الشك بوجود حالة اسعافية، أن تتصل بسرعة بخدمة الإسعاف (طبيب أو طبيبة الطوارئ).

عزيزي المريض، عزيزتي المريض،

أنت مصاب بـ داء الشريان التاجي المزمن - المعروف أيضاً بالمصطلح المختصر CHD. يمكن أن يكون لهذا المرض عواقب مهّدة للحياة، مثل التعرض لنوبة قلبية. ليس من السهل دائمًا التمييز بين حالة التدهور المؤقت القصيري المدى وحالة الطوارئ الخطيرة. إذ غالباً ما يكون الانتقال من حالة إلى أخرى غير واضح. تقدم لك هذه الإرشادات معلومات حول كيفية التعرف على حالة طارئة وعن الطريقة الأفضل للتعامل معها. نقوم إضافة إلى ذلك بتقديم بعض النصائح لأقربائك.

هذا ما ينبغي لك القيام به في حالة الطوارئ

ينبغي لك أن تطلب المساعدة فوراً في حالة الطوارئ!

أطلب الرقم 112.

أدل بالمعلومات التالية:

■ من يتكلّم؟

■ ماذا حدث؟ مثلًا: الاشتباه في حدوث نوبة قلبية

■ أين تتوارد؟

■ ما هي الإجراءات التي قمت بها حتى الآن لتخفييف الأعراض؟

مثلًا: استعمال الرذاذ نيترو.

قم بما يلي إلى حين وصول المساعدة:

■ حاول أن تبقى هادئاً.

■ تناول دواءك الخاص بحالات الطوارئ.

■ تخلص من الملابس الضيقة.

■ افتح باب الشقة أو المنزل إذا كنت لوحدك في المنزل.

يمكنك الاطلاع على المعلومات الأساسية المرتبطة بهذا المرض في المنشورة الاستعلامية "داء الشريان التاجي" - عندما تضيق شرايين القلب" وفي منشورة إرشادات المرضى "داء الشريان التاجي المزمن": أنظر إلى الخانة المتواجدة بالوجهة الخلفية.



الرسم: Patrick Rebacz / www.visionom.de

- اجلس راكعاً بجانبه بحيث تكون في نفس مستوى صدر المريض.

- ضع كف يد واحدة على منتصف القفص الصدري للمريض.

- ضع اليد الأخرى على رأس اليد الأولى.

- اضغط بقوه على القفص الصدري لينخفض هذه الأخيرة بحوالى 5 إلى 6 سم مع إبقاء ذراعيك ممدودة أثناء القيام بذلك.

- من الضروري أن يتم ذلك بوتيرة سريعة: حوالي مرتين في الثانية.

- تعتبر هذه العملية مرهقة جداً. ينبغي لك - إذا كان ذلك ممكناً - أن تعمل على التناوب مع شخص آخر بعد كل بضع دقائق.

- احرص على الاستمرار في الضغطات الصدرية حتى قدم المسعفين أو يسترجع المعني بالأمر وعيه.

- بلجوك إلى هذه العملية تكون قد فعلت كل شيء كما يجب. إذ لا ينبغي أن تتردد في التصرف خوفاً من أن يكون ذلك أمراً خطيراً. لا داعي لمحاولة قيام الأشخاص عديمي الخبرة بتقديم التنفس الإنقاذي لشخصٍ فاقدٍ للوعي، حيث أنها توفر مساعدة قيمة حتى من دون تقديمها للتنفس الإنقاذي.

■ غالباً ما تتوفّر الأماكن العامة على جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (مختصر: AED)، مثلًا في محطات القطارات الكبيرة أو في قاعات الاستقبال. يمكنك التعرّف على الجهاز بواسطة هذه العلامة:



الرسم © Fot Hansel / Fotolia

ينبغي لك استخدامه إذا كان ذلك ممكناً. يقوم الجهاز بالتحدث إليك ويخبرك خطوة بخطوة بما يجب القيام به، حيث سيكون من الخطأ عدم استخدامه.

ما يمكن القيام به قبل ذلك

غالباً ما تحدث مثل هذه الحالات الاصعافية بشكل غير متوقع وفجأة، ولهذا من المهم أن يكون المرء مستعداً.

■ يوصي الخبراء بأن تحرص دائماً على اصطحاب دواءك الخاص بالطوارئ معك - مثلًا التترات سواء على شكل رذاذ أو قطرات أو كبسولات.

■ يمكنك طالبة طبيبك أو طبيبك بأن توضح لـك بدقة كيفية استعمال دواء الطوارئ.

■ من المهم أن تحرص دائماً على أن تكون بحوزتك كمية كافية من الأدوية.

■ من الجيد أن تخبر أقاربك وزملائك بأن مرضك قد يتسبب في حدوث حالة اسعافية. أخبرهم بما يجب عليهم فعله في هذه الحالة. انسخ شريك أو شريكة حياتك بحضور دورة لقمة الإسعافات الأولية.

■ من المفيد أيضًا أن تعلم على وضع ورقة في محفظة النقود الخاصة بك وأن تكتب عليها لائحة لجميع الأدوية التي تتناول مع إضافة ملاحظة تفيد بذلك تعاني من داء الشريان التاجي. يجب أن تتضمن هذه الورقة أيضاً أرقام هواتف أقاربك ورقم عيادة طبيب الأسرة الخاص بك.

كيف يمكن للأقارب المساعدة

عندما ينهاز شخص ما ويُفقد وعيه بسبب سكتة قلبية، فإن كل دقيقة تمر تعتبر ثمينة للغاية. يمكنك المباشرة في تقديم المساعدة حتى قدوم خدمة الطوارئ الطبية:

■ اتصل بالرقم 112 أو كايف شخصاً آخر بذلك.

■ ابدأ على الفور بإجراء تمسييد القلب:

- يكون الشخص المريض مستلقياً على ظهره.

المزيد من المعلومات

ترتكز هذه المعلومات الخاصة بالمرضى على منشورات إرشادات للمرضى "داء الشريان التاجي المزمن":

www.patienten-information.de/patientenleitlinien/khk

أنشئت إرشادات المرضى في إطار برنامج إرشادات الرعاية الوطنية. يتم دعمها من طرف الجمعية الطبية الألمانية، الإتحاد الفدرالي لصناديق تأمين الأطباء واتحاد الجمعيات المهنية الطبية الطبية.

المؤهّجات والمصادر: www.patienten-information.de/kurzinformationen/koronare-herzkrankheit-notfall#methodik
www.patienten-information.de

ينبغي للتعرف على منظمة المساعدة الذاتية بالقرب منكم، الاتصال ب NAKOS (المصلحة الوطنية للمعلومات الخاصة بتشجيع ومساعدة مجموعات مساعدة الذات):
030 3101 8960، الهاتف: www.nakos.de

مسؤول عن المضمون

مركز الأطباء للجودة في الطب (ÄZQ)
لحساب: المجموعة الإتحادية لأطباء التأمين الصحي (KBV) والجمعية الطبية الألمانية (BÄK)

الفاكس: 030 4005-2555
البريد الإلكتروني: patienteninformation@azq.de
www.patienten-information.de
www.azq.de



مع أطيب التحيات